

เป็นกี๊เกิดจากตับที่เต็มไปด้วยพังผืดมาเป็นเวลากาน
จึงทำให้ตับไม่สามารถทำงานได้
ความรุนแรงขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ตับยังเหลือพอดีจะทำงานได้เป็นปกติ

สาเหตุ

เป็นได้หลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือการดื่มเหล้าเป็นเวลากานๆ
รวมถึงการกินยา หรือยาเสพติด ไขมันพอกตับ การติดเชื้อ¹
การส่งต่อทางพันธุกรรม เช่น
ภาวะเหล็กเกินและประสมตามอวัยวะต่างๆ (hemochromatosis)
) หรืออวัยวะพลิตสารคัดหลังมากเกินไป (cystic fibrosis)
โรคตับอักเสบจากไวรัส หรือสารพิษที่มีผลกำลังตับ และโรคของก่อน้ำดี



อาการ


อาการเริ่มแรก จะรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่อยากอาหาร
อาเจียน น้ำหนักลด ตับโต ฟ่าเมือฟ่าเก้าແດງ
ระยะถัดไปจะพบอาการเหลืองของตาและผิวหนัง




ปัสสาวะสีเข้ม พมร่วง พบร่วง เส้นเลือดลักษณะคล้ายไหมบุหรี่ตามตัว
บนตากในผู้ชาย เขียวช้ำและเลือดออกง่าย ก้อนเสีย มีภาวะสับสน
ก้อนบวนน้ำ ขาบวนกดแล้วบุบ ม้ามโต มีริดสีดวง และอาจ疼ม่าได้

วินิจฉัย

จากการขักประวัติ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ CT scan
ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด





รักษา

หลักการสำคัญคือแก้ที่สาเหตุ
และรักษาตามอาการ เช่น กินอาหารที่แคลอรี่สูง
มีโซเดียม จำกัดน้ำ เพื่อลดการสัมผัสน้ำในท้อง
สำหรับผู้ป่วยที่มีท้องนานหรือมีน้ำสีใสในท้องปริมาณมาก ควรให้ยา diuretic
เพื่อขับน้ำออก ส่วนยาตัวอื่นให้เพื่อควบคุมอาการทางสมองอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ควรไม่ควร

- ✓ ควรหยุดดื่มน้ำผลไม้
- ✓ ควรกินอาหารให้สมดุล ไม่ควรกินโปรดตับมากเกินไป
- ✓ ควรเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้อาหารเหลวอยู่ดีขึ้น
- ✓ ควรได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี หากคุณอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
- ✓ ควรรับประทานแพทช์กันที่หากในระหว่างการรักษา หากอาเจียนเป็นเลือดสด

อุจาระสีดำ



ห้ามเลือดปน
ห้ามก่อภัยน้ำ
ห้ามมากขึ้นห้ามไข้

✗ ไม่ควรดื่มน้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลย

✗ ไม่ควรใช้ยาจำพวก acetaminophen sedative tranquilizer ซึ่งมีผลทำลายตับ