


เป็นโรคที่เจอบ่อยในการติดเชื้อของผิวหนัง เล็กๆ น้อยๆ มักเกิดในเด็กหรือทารก สามารถแพร่กระจายได้เร็วจากคนหนึ่งสู่อีกคน แก่ออยู่ในสถานที่แออัด ติดจากພີ່ສູ່ນ້ອວ หรือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง



สาเหตุ

แบคทีเรียสองชนิด คือ staphylococcus และ streptococcus ที่เป็นสาเหตุของโรคพุพอง อาจพบทั้งสองตัวหรือตัวเดียวก็ได้ เพราะแบคทีเรียเหล่านี้อาศัยอยู่บนผิวหนังของเราและก่อให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นเดียวกันหากมีแผล

สัตว์กัด ข่วน ถลอก ยั้วในเด็กเล็ก ๆ แพร่กระจายเชื้อได้ดี เพราะมือไปจับขงเล่น หรืออื่นโดยไม่ล้างมือ

อาการ

โรคพุพองเริ่มจากตุ่มน้ำที่ไม่เจ็บ ที่บริเวณใบหน้า โดยเฉพาะรอบจมูกและปาก ตุ่มน้ำมีสีใสหรือออกสีเหลืองอ่อนๆ เมื่อแตกออกมาจะกลายเป็นสะเก็ดน้ำตาๆ ตุ่มน้ำอาจคันและแสบ แต่ไม่เคยทิ้งรอยแผลเป็น



วินิจฉัย

ตรวจที่แผลบนผิวหนัง และตรวจสอบหาเชื้อแบคทีเรียโดยใช้สำลีป้ายลงตุ่มน้ำ และเก็บเลือดและปัสสาวะเพื่อส่งตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น



รักษา

โรคพุพองควรรักษาให้เร็วเพื่อป้องกันการเชื้อลามลงไปใต้ผิวหนัง ถ้าไม่รับรักษาตุ่มน้ำจะอยู่เป็นสัปดาห์ โรคนี้ตอบสนองต่อต่อยาอย่างรวดเร็วร่วมกับฟลอกซาซิโนนและล้างให้สะอาด ส่วนใหญ่อาการจะหายไปภายใน 7-10 วัน ยาปฏิชีวนะสำหรับทาจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีกทีสก็ตแพลงก็จะค่อยๆหลุดออกไป

ควรไม่ควร

- ✓ ควรรักษาความสะอาดร่างกายให้สะอาดและฟอกสบู่ที่สำหรับฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละครั้ง
- ✓ ควรฟอกสบู่ทุกครั้งเมื่อมีแผล โดนบาดหรือสัตว์กัด หรือข่วน
- ✓ ควรรักษาความสะอาดของเล่นของเด็กสม่ำเสมอ
- ✓ ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบเมื่อกินยาแล้วรู้สึกผิดปกติ
- ✓ ควรตัดเล็บให้เด็กๆ เพื่อป้องกันการข่วน
- ✓ ควรพบแพทย์ทันทีเมื่ออาการไม่ดีขึ้นภายใน 7-10 วัน มีไข้หรือคนในครอบครัวติดเชื้อด้วย ปัสสาวะเป็นเลือดเป็นต้น



- ✗ ไม่ควร บีบหรือแกะตุ่มน้ำ
- ✗ ไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นหากคุณกำลังติดเชื้อ
- ✗ ไม่ควรโกนหนวดบริเวณที่มีตุ่มน้ำ
- ✗ ไม่ควรใช้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูที่นอนร่วมกับผู้อื่น