



ไขมันพอกตับ(fatty liver disease)

ไขมันที่สะสมก่ำตับเป็นปริมาณมากมักเกิดในผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน หรือบุคคลที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก



ไขมันพอกตับอาจไม่เป็นอันตรายแต่หากเกิดการอักเสบขึ้นมาเป็นเวลนาบานๆ เนื้อตับจะเกิด|| พลเป็นดึงรั้งกับส่วนอื่นของตับทำให้ตับทำงานไม่เป็นปกติ

สาเหตุ



สาเหตุที่ทำให้มีไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์เกิดจากการอักเสบของบริเวณที่ไขมันพอกตับซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือตับอักเสบจากไวรัส

ส่วนใหญ่มักเกิดในที่น้ำหนักเกินและคนที่
จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน



และเป็นสาเหตุของโรคตับในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

อาการ

ไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกตับหรือไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์มักไม่ค่อยมีอาการแต่สำหรับบางคนอาจมีการปวดหรือไม่สบายท้องหากว่าตับมีขนาดใหญ่กว่าเดิม

วินิจฉัย


แพทย์มักพบร่องรอยจากการตรวจเลือดหรือค่าแล็บของตับซึ่งเป็นการตรวจพื้นฐานอยู่แล้ว

ดังนั้นแพทย์ซึ่งประวัติและตรวจร่างกายต่อเพื่อที่จะตัดโรคที่มีอาการคล้ายโรคนี้ เช่น ตับอักเสบจากไวรัส ตับพังจากการดื่มแอลกอฮอล์

รักษา

ลดน้ำหนักหลักเลี้ยงการดื่มแอลกอฮอล์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาไข้บันพอกตับในส่วนไข้บันพอกตับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์แล้วผู้ป่วยมีไข้บันในลีดสูงเบาหวาน หรืออ้วน

ควรจะควบคุมน้ำตาลในเลือดและระดับไข้บันโดยการอาหากรักษาที่ดีและออกกำลังกายแพทช์จะให้ยาเพื่อลดไข้บันและการอัดเสบร่วมด้วย



ควรไม่ควร

- ✓ ควรทราบว่าการตัดชั้นเนื้อยื่นตับมาตรวจไม่ได้ใช้วิธีจ่ายไข้บันพอกตับแต่เป็นเพียงพื้นตัดโรคอื่นที่เกิดคุณข้องออกไป
- ✓ ควรสอบถามแพทย์เกี่ยวกับยาที่มีผลกำลังตับ เช่น acetaminophen และยาบางตัวที่ใช้รักษาเบาหวานหรือยาพวงกลดไข้บันในลีด
- ✓ ควรลดน้ำหนักหากมีน้ำหนักเกิน



- ✗ ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ จะมีผลช่วยลดไข้บันที่อยู่ในตับ
- ✗ ไม่ควรลืมว่ามีผู้ป่วยไข้บันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้วกล้ายเป็นตับแข็งได้ และมีภาวะแทรกซ้อนที่จากตับเสียการทำงานไป เช่น พิวเหลือง ท้องบวน ชาบวน