




ไส้ติ่งเป็นลำไส้ส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ส่วน ลำไส้ซีกัม สามารถเกิดการบวมและอักเสบได้หากมีการติดเชื้อ และอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ไส้ติ่งอักเสบเกิดขึ้นในกลุ่มคนอายุ 10-30ปี



## สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน ระบุเปิดบริเวณลำไส้ซีกัมอุดตันทำให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย การติดเชื้อทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้ ไส้ติ่งขาดเลือด และแตกได้สิ่งที่ไปอุดตันบริเวณไส้ติ่งได้เช่น เมล็ดพืชที่ไม่ย่อย ต่อม้ำเหลืองเกิดจากไวรัส ปรสิต ก้อนเนื้องอก



## อาการ

ปวดท้องบริเวณสะดือและย้ายลงไปท้องด้านล่างขวา เจ็บมากขึ้นเมื่อไอ ขยับตัว ยิ่งทำให้เจ็บมากขึ้น อาจมีคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องท้องบวม ไข้ต่ำ หากปล่อยไว้นานเกินไปไส้ติ่งอาจแตกได้ เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษาเร่งด่วน



## วินิจฉัย

จากการซักประวัติตรวจร่างกาย ตรวจเลือด การทำอัลตราซาวด์ และCTเพื่อช่วยตัดโรคที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป



## การรักษา

การผ่าตัดไส้ติ่งออก ที่นิยมคือผ่าตัดส่องกล้อง ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อและยาแก้ปวด ยาทำให้อุจจาระนิ่ม



## ควรไม่ควร

- ✓ ควรรีบบอกแพทย์หากมีอาการ ไส้ติ่งอาจแตกได้
- ✓ ควรรีบบอกแพทย์หากมีคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด ก้อนในท้อง



✗ ไม่ควรพลาดนัดแพทย์

