




การกำหนดการแพ้ยา (ข้ามกลุ่ม, ด้วยยาสำคัญ)


เป็นการตรวจสอบการแพ้ยาของคนไข้โดยมีการตรวจสอบ 2 แบบ คือ

คนไข้แพ้ยาตัวนี้โดยตรง โปรแกรมจะตรวจสอบจากส่วนผสมของยาหากคนไข้แพ้นั้นโปรแกรมจะแจ้งเตือน ดังตัวอย่างนี้



รูปภาพ ขั้นตอนการแพ้ยาด้วยยาสำคัญ รูปที่ 1


เพิ่มรายการยา



รูปภาพ ขั้นตอนการแพ้ยาด้วยยาสำคัญ รูปที่ 2




แจ้งเตือนแพทย์



รูปภาพ ขั้นตอนการแพ้ยาตัวยาสำคัญ รูปที่ 3

คนไข้แพ้ยาในกลุ่มเดียวกัน โปรแกรมจะตรวจสอบกับกลุ่มการออกฤทธิ์ของยาหากเป็นกลุ่มเดียวกันโปรแกรมจะแจ้งเตือนดังตัวอย่างนี้



รูปภาพ ขั้นตอนการแพ้ยาข้ามกลุ่ม รูปที่ 1



Diclofenac และ Celecoxib อยู่กลุ่มออกฤทธิ์เหมือนกัน

ข้อมูลเวชภัณฑ์ยา **DICLOFENAC INJ 25 MG/ML (3 ML) AM** Log

ข้อมูล

ลำดับ	กลุ่มการออกฤทธิ์	เป็นมือสิ่งยาในกลุ่มเดียวกัน
1	ACETIC ACID(NSAIDs)	<input type="checkbox"/>
2	NON-STEROIDAL ANTHINFLAMMATORIES (NSAIDs)	<input checked="" type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>

ปุ่มเมนู: ข้อมูลทั่วไป, ฉลาก, วิธียใช้, การคิดค่าบริการ, สิทธิการสั่งใช้, คำแนะนำ, การตัดจ่ายคลังสินค้า, คำค้นหา, **กลุ่มการออกฤทธิ์**, ชื่อเรียกอื่นๆ, รหัสมาตรฐาน, กำหนดโรคที่สั่งได้, ตรวจสอบการสั่ง, การแจ้งเตือน, เอกสารแนบ, รูปภาพ, ประวัติการสั่งใช้, Drug Interaction, ประวัติรายการ, Drug Information, สกส./FWF, การปรับปรุงราคา, พิมพ์

ปุ่ม: **ลบ**, บันทึก, ปิด

รูปภาพ ขั้นตอนการแพ้ยาข้ามกลุ่ม รูปที่ 2

รายชื่อผู้ป่วยรอดตรวจ Test- วันที่ 14/8/2562 Q 4 ลำดับแสดงคิว ตามประเภทคนไข้, ศิวรับบริการ Auto refresh ปิดหน้าจอ

รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว แสดงรูป HOSxPMedicationOrderDrugAllergyNoticeForm

ลำดับ	วันที่รายงาน	ยาที่แพ้	อาการ	ความร้ายแรง
1	14/8/2562	AMOXICILLIN	ใจสั่น	ร้ายแรง - อันตรายถึงชีวิต
2	14/8/2562	DICLOFENAC	มีผื่นขึ้นตามร่างกาย	ร้ายแรง - อันตรายถึงชีวิต

แพ้ยา DICLOFENAC

ปุ่ม: Single Tab, New window mode, 1 of 2, ปรึกษา

รูปภาพ ขั้นตอนการแพ้ยาข้ามกลุ่ม รูปที่ 3



สั่งยาแล้วเตือนข้ามกลุ่ม

The screenshot shows the DoctorWorkBenchQueueForm interface. A red callout bubble points to the 'Dicloxacillin 250 MG CAP' entry in the medication list, with the text 'ศิยาที่ไม่ได้แต่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน' (Medication not in the same group). Another red callout bubble points to the 'Cross allergy check - DICLOXACILLIN with AMOXICILLIN' warning box, with the text 'โปรแกรมแจ้งเตือนเพียข้ามกลุ่ม' (Program alert for cross-group medication). The interface also displays a table of medications and a summary of charges.

ลำดับ	ยี่ห้อ	FL	P	จุดบันทึก	ชื่อรายการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	ส่วนลด	รวมราคา	ผู้สั่ง
1				092 A.T.C	คำปรึกษาผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ		1	50.00		50.00	
> 2				000 คลินิกผู้สูงอายุ	CELECOXIB 200 MG CAP	กินครั้งละ วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร เข้า	1000	30.50	0.00	30,500.00	ณรงค์ชัย ธิญูโชติ

รูปภาพ ขั้นตอนการเพียข้ามกลุ่ม รูปที่ 4