



<https://sukunya1.wordpress.com/2013/02/06/>

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อไทย | ประดู่ป่า (Burmese rosewood) |
| ชื่อท้องถิ่น | ประดู่ (ภาคกลาง) ประดู่เสน (ราชบุรี สระบุรี) ตู๋ ตู๋ป่า กะเลน (ภาคเหนือ) |
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | <i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz |
| ชื่อวงศ์ | FABACEAE |

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะต้น ไม้ยืนต้น ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20 -

30 เมตร เรือนยอดรูปเจดีย์ต่ำๆ เปลือกนอกสีน้ำตาลปนเทา หนา แตกเป็นร่อง เมื่ออายุมากขึ้น เปลือกในสีน้ำตาล มียางสีแดง เนื้อไม้แข็งสีขาวอมเหลือง แก่นสีน้ำตาลแกมแดง

ลักษณะใบ ใบประกอบขนนกชั้นเดียว ปลายใบคี่ ใบย่อยเป็นรูปร่างค่อนข้างมน หรือรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน ฐานใบมน ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ใบมีลักษณะคล้ายแผ่นหนังบาง ๆ ท้องใบมีขนอ่อน ๆ ปกคลุม

ลักษณะดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยสีเหลือง รูปถ้วย กลีบเลี้ยงสีน้ำตาลอมเขียว หรือสีเขียว 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 2 แฉก แบ่งเป็นอันบน 2 กลีบ ติดกัน และอันล่าง 3 กลีบติดกัน กลีบยาวประมาณ 6 - 8 มิลลิเมตร กลีบดอกรูปผีเสื้อ สีเหลืองแกมแดง มี 5 กลีบ ยาวประมาณ 8 - 15 มิลลิเมตร มีเกสรเพศผู้ 10 อัน เกสรเพศเมียมี 1 อัน รังไข่สีเขียว มีขนเล็กๆ ขึ้นปกคลุม ดอกมีกลิ่นหอม

ลักษณะผล ผลแบบผลปีกเดี่ยว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร ผลอาจมี 1 - 3 เมล็ด ปีกของผลจะมีสีเขียวเมื่อยังอ่อนอยู่และจะกลายเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่จัด

ระยะเวลาออกดอกติดผล

ออกดอกในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ผลแก่ประมาณเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน

เขตการกระจายพันธุ์

พบในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ลาว ไทย กัมพูชา และทางใต้ของเวียดนาม กระจายพันธุ์ในป่าเบญจพรรณแล้ง ป่าเบญจพรรณผสม และในป่าดิบแล้งทั่วๆ ไป

การใช้ประโยชน์

เนื้อไม้: ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆ ไป ทั้งภายในและภายนอก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้
เปลือกไม้: ใช้ย้อมผ้า และให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง

แหล่งข้อมูล: สำนักงานหอพรรณไม้ - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

