

เทคนิค

**การผลิตลำไยนอกฤดู
เพื่อการส่งออก**



NutraPlant™



ลำไย

ลำไย (ชื่อวิทยาศาสตร์: *Dimocarpus longan*, มักเขียนผิดเป็น ลำไย) มีชื่อเรียกทางพื้นบ้านภาคเหนือว่า "ป่าลำไย" ชื่อภาษาอังกฤษว่า Longan อยู่ในวงศ์ Sapindaceae เป็นพืชไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อ สีขาวครีม ผลทรงกลมเป็นช่อ ผลดิบเปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ำตาลล้วน เนื้อลำไยสีขาวหรือชมพูอ่อน เมล็ดสีดำเป็นมัน เนื้ออ่อนเมื่

ลำไยนิยมปลูกในหลายประเทศ แหล่งปลูกขนาดใหญ่คือประเทศจีนมีการปลูกลำไยถึง 26 สายพันธุ์ โดยส่วนมากปลูกในมณฑลกว่างตุง 12 สายพันธุ์ ปลูกในประเทศไต้หวันอีก 15 สายพันธุ์ ปลูกในสหรัฐอเมริกา 1 สายพันธุ์ คือพันธุ์โคฮาลา และในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีแหล่งปลูกลำไยขนาดใหญ่ไม่แพ้จากประเทศจีน โดยมักปลูกในเวียดนามทางตอนเหนือที่มีอากาศหนาวเย็น โดยพันธุ์ลำไยของเวียดนามนั้นนำเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทนได้ในอากาศเย็นจัดจนถึงจุดเยือกแข็ง ซึ่งต่างจากลำไยของประเทศไทยเกิดการกลายพันธุ์เป็นลำไยเมืองร้อน สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 40-43 องศาในฤดูร้อน



ระยะพื้ต้นตั้งใบอ่อน



- เร่งการแตกใบอ่อน
- ใบอ่อนแตกสม่ำเสมอ

ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรา-แพลนท์ 21-4-4
อัตรา 300 ซีซี



นูตร้ามิกซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม



ชีเฟรช
อัตรา 200 ซีซี

ระยะขยายขนาดและบำรุงใบ



- ช่วยขนาดใบใหญ่
- ใบสมบูรณ์

ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรา-แพลนท์ 13-13-13
อัตรา 300 ซีซี



นูตร้ามิกซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม



มอเตอร์เวย์
อัตรา 200 ซีซี

ระยะสะสมอาหาร



- เพิ่มความสมบูรณ์เพื่อการออกดอก
- เร่งใบแก่พร้อมกัน เพื่อการทำสาร

ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรา-แพลนท์ 4-24-26
อัตรา 300 ซีซี



นูตรา-มิกซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม



นูตรา-แม็กซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม

ระยะเปิดตาดอก



- ช่วยดอกออกสม่ำเสมอ
- ดอกไม่แดง

ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
หลังทำสาร 15-20 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรา-แพลนท์ 4-24-26
อัตรา 300 ซีซี



โบลาเวอร์
อัตรา 200 ซีซี



- ช่วยยึดช่อดอก
- ช่วยป้องกันดอกปนใบอ่อน

ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรา-แพลนท์ 4-24-26
อัตรา 300 ซีซี



นูตร้ามิกซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม



ชีเฟรส
อัตรา 200 ซีซี

6 ระบุบำรุงช่อดอกก่อนบาน



- ช่วยช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรง
- พร้อมต่อการผสมเกสร

ฉีดพ่น 1- 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรา-แพลนท์ 4-24-26
อัตรา 300 ซีซี



นูตร้ามิกซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม



นูตรา-แคลเทค
อัตรา 100 ซีซี

ระยะขึ้นลูกติดผลอ่อน



- ช่วยการติดผล
- ลดการหลุดร่วง

ฉีดพ่น 1- 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรำมิกซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม



นูตรำ-แคลเทค
อัตรา 100 ซีซี



- ช่วยเปลือกหนาขึ้นเหนียว
- เปลือกเขียว ทรงสวย

ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรา-แพลนท์ 21-4-4
อัตรา 300 ซีซี

นูตร้ามิกซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม

นูตรา-แคลเซียม
อัตรา 100 ซีซี



- ช่วยผลโตสม่ำเสมอ

ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรา-แพลนท์ 13-13-13
อัตรา 300 ซีซี



นูตร้ามิกซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม



นูตรา-แอลฟาเทค
อัตรา 100 ซีซี

ระยะสร้างเนื้อสร้างน้ำหนักร



- น้ำหนักดี
- สีพลสวย

ฉีดพ่นช่วงลำย 5 เดือน 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



นูตรา-แพลน 10-5-20
อัตรา 300 ซีซี



นูตรามิกซ์-สปาร์ค
อัตรา 50 กรัม



นูตรา-แคลเทค
อัตรา 100 ซีซี



- ช่วยป้องกันและรักษาโรค
ผลแตกพละน้า

ฉีดพ่นช่วงลำย 5 เดือน 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

* ทุกอัตราใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร



แอกทอค

อัตรา 100 ซีซี



NutraPlant™

บริษัท นูตราพลานท์