



## การถ่ายนมผสมโครงการลดการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
2. เพื่อลดการขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV
3. เพื่อสร้างความผูกพัน และความรับผิดชอบของมารดาของเด็กที่ติดเชื้อ HIV
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับมารดาที่ติดเชื้อ HIV ในการซื้อนมผสมให้กับบุตร
5. เพื่อลดการถูกทอดทิ้งของเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV
6. เพื่อสนับสนุนนมผสมให้กับเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่แรกเกิด - อายุ 1 ปี 6 เดือน

### อุปกรณ์

1. แฟ้มประวัติ ( OPD Card เด็ก ) ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV
2. นมผสมสำหรับเด็ก สูตรทารกแรกเกิด และสูตรต่อเนื่อง อายุ 6 เดือน - 3 ปี
3. บัตรนัดรับนมผสม
4. สมุดบันทึกรับนม เพื่อทำสถิติต่อไป

### ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### กรณีเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV นอนโรงพยาบาล

1. กุมารแพทย์ มีคำสั่งให้รับนมผสมและยาต้านไวรัสเอดส์ ในเด็กหลังคลอด เป็นลายลักษณ์อักษร ในแฟ้มประวัติของเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV
2. เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย นำแม่และเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV มารับนมผสมและยาต้านไวรัสเอดส์ ที่กลุ่มงานอนามัยชุมชน
3. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยชุมชน ลงทะเบียนเด็กรับใหม่และเข้าโครงการลดการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยชุมชน ถ่ายนมผสมและยาต้านไวรัสเอดส์ ให้กับมารดาของเด็กที่มารับนมผสมและยาต้านไวรัสเอดส์
5. มารดาของเด็กเซ็นชื่อรับนมผสมและยาต้านไวรัสเอดส์ ในสมุดบันทึกรับนมทุกครั้ง
6. ทุกสิ้นเดือน ทำรายงานส่งสถิติ การเบิก - จ่ายนมผสม กับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

#### กรณีเด็กทั่วไปที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV

1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก ยื่นรับบัตรตรวจ ( OPD Card เด็ก ) ที่ห้องเวชระเบียนพร้อมบัตรนัดรับนมผสม

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

