

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ผู้ให้บริการพึงพอใจ เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี สถานที่สวยงาม	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL	หมายเลขเอกสาร WI-IC01-007
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : - 8 เม.ย. 2547
เรื่อง วิธีการล้างมือแบบแห้ง (Hand dry scrub)		

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อจากมือบุคลากร ไปสู่ผู้ป่วย และจากผู้ป่วยสู่บุคลากรหรือผู้ป่วยอื่น ๆ (Cross-Infection)
- 1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากร
- 1.3 ใช้ในกรณีไม่มีอ่างล้างมือ อ่างล้างมือไม่เพียงพอ อ่างล้างมืออยู่ไกล อยู่ในภาวะเร่งด่วนหรือน้ำไม่ไหล

2. ขอบเขต

ครอบคลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคน

3. นิยามศัพท์

การล้างมือแบบแห้ง หมายถึง การล้างมือในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือแบบเปียกได้ เป็นการล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งผลิตโดยฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

บุคลากรทางการแพทย์

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

- 6.1 ใช้น้ำยาล้างมือแห้ง (Hand dry scrub) ในปริมาณเพียงพอที่จะเปียกมือได้ทั่ว (กดน้ำยาจากขวด 1 ครั้ง จะได้น้ำยาประมาณ 3-5 ซี.ซี) ถูมือทั้ง 2 ข้าง ให้ทั่วจนกระทั่งมือแห้ง (ใช้เวลาประมาณ 20-30 วินาที) ไม่ต้องใช้น้ำล้างมือซ้ำ แล้วจึงไปดูแลรักษาผู้ป่วย
- 6.2 น้ำยาล้างมือแบบแห้งเบิกได้จากห้องยา เติมน้ำยาในปริมาณที่เพียงพอใช้ภายใน 1 สัปดาห์ ลงในภาชนะที่แห้ง (วันหมดอายุของน้ำยาตามที่ฝ่ายเภสัชกรรมกำหนด)
- 6.3 การทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำยาล้างมือแห้งให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำและผงซักฟอกคว่ำให้แห้ง
- 6.4 ในกรณีที่มือเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น เลือด ต้องล้างออกก่อน เพราะสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ จะทำให้น้ำยาออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ดี

7. เอกสารอ้างอิง

8. บันทึก

เอกสารควบคุม
CONTROLLED DOCUMENT

