



โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI - NUR๐๑ - ๐๒๒

โรงพยาบาลคุณธรรมที่สร้างสรรค
นวัตกรรมเพื่อประชาชน

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐
วันที่บังคับใช้ : ๐๑ ต.ค. ๒๕๖๕

หน้า
๑/๔

เรื่อง แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้แพทย์และพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของหน่วยงานโรงพยาบาล เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเอชไอวีได้

๒. ขอบเขต

บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน

๓. นิยามศัพท์

การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้รับบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของหน่วยงานได้รับการคัดกรองเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิกให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ที่ให้บริการให้คำปรึกษาแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน



๕. อุปกรณ์และเครื่องมือ

แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ



เรื่อง แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติ/Flow Chart

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ขั้นตอนรายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
<p>๑. แพทย์/พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก/ใน ด้านอายุรกรรม/ศัลยกรรม ได้แก่</p> <p>๑.๑ แผนกผู้ป่วยนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลินิกตรวจโรคทั่วไป - คลินิกประกันสังคม - คลินิกอายุรกรรม - คลินิกศัลยกรรม - คลินิกศัลยกรรมกระดูก - คลินิก หู คอ จมูก - คลินิก ตา - คลินิกไตเทียม <p>๑.๒ แผนกผู้ป่วยใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หอผู้ป่วยสามัญหญิง - หอผู้ป่วยสามัญชาย - หอผู้ป่วยประกันสังคมชาย - หอผู้ป่วยประกันสังคมหญิง - หอผู้ป่วยพิเศษ๔ - หอผู้ป่วยโควิด ๙ - หอผู้ป่วยพรีเมียม - หอผู้ป่วย ICU - หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย - หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง - หอผู้ป่วยชีวาภิบาล - หอผู้ป่วย Palliative - หอผู้ป่วย Intermediate care - หอผู้ป่วย ICU palliative 	<pre> graph TD A[คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของหน่วยงานผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก/ใน] --> B[ส่งตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี] B --> C[ให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี] C --> D[บันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงในระบบ e phis] D --> E[เจาะเลือดตรวจเอชไอวี] </pre>	<p>พยาบาลวิชาชีพคัดกรองความเสี่ยงของหน่วยงานโดยการซักประวัติตามกลุ่มอาการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไข้เรื้อรัง - กลุ่มผื่นตื้น/หัดถาวร - ท้องเสียเรื้อรัง - ผื่นผิวหนังไม่ทราบสาเหตุ - น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ - ต่อมน้ำเหลืองโต <p>- ส่งตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีในระบบ e-phish ANTI-HIV ๔ GEN</p> <p>- ให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือด</p> <p>- เซ็นใบยินยอมตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี</p> <p>- ลงบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาในระบบ e phis</p>	<p>กองโรคติดต่อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>กรมควบคุมโรค (๒๕๖๔).แนวทาง การตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี</p>


ต้นฉบับ
MASTER



เรื่อง แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ขั้นตอนรายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
<p>๒.แพทย์/พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก/ใน ด้านสูติ - นรีเวชกรรมและ กุมารเวชกรรม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลินิกฝากครรภ์ - คลินิกนรีเวชกรรม - คลินิกกุมารเวชกรรม - หอผู้ป่วย NICU - หอผู้ป่วยคลอด - หอผู้ป่วยสูติ - นรีเวชกรรม - หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอชไอวีของของ หน่วยงานผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยนอก/ใน </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ส่งตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ให้คำปรึกษาตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> บันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงใน ระบบ e phis </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> เจาะเลือด ตรวจเอชไอวี </div>	<p>พยาบาลวิชาชีพคัดกรองความ เสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หญิงตั้งครรภ์ - คู่หญิงตั้งครรภ์ - ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - คู่ผู้ป่วยโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ - ทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อ เอชไอวี - ทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อ ซิฟิลิส <p>- ส่งตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ในระบบ e-phis ANTI-HIV ๔ GEN</p> <p>- ให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือด - เชิญใบยินยอมตรวจเลือดหา เชื้อเอชไอวี</p> <p>- ลงบันทึกข้อมูลการให้ คำปรึกษาในระบบ e phis</p>	<p>- กองโรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (๒๕๖๔).แนว ทางการตรวจรักษา และป้องกันการติด เชื้อเอชไอวี</p>

ต้นฉบับ
MASTER

 โรงพยาบาลคุณธรรมที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อประชาชน	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL		หมายเลขเอกสาร WI - NUR๐๑ - ๐๒๒
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : ๐๐ วันที่บังคับใช้ : ๐๑ ต.ค. ๒๕๖๕	หน้า ๔/๔
เรื่อง แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและส่งตรวจเอชไอวีของโรงพยาบาล			

๗. เอกสารอ้างอิง

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (๒๕๖๔).แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี.กรุงเทพ:ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิกแอนดดีไซน์

๘.บันทึก

แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี



