

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ต้นฉบับ

MASTER

เป็นโรงพยาบาลศุภลักษณะขึ้นนำของกทม. ส่งกรุงเทพฯ ประจำปี 2559

วิธีปฏิบัติงาน
(WORK INSTRUCTION)

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำให้นม

หมายเลขอเอกสาร WI – NUR01-005 จำนวนหน้าทั้งหมด 3 หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	✓ ✓	28 ธันวาคม 2552
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	✓ ✓	26 พฤษภาคม 2553
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	✓ ✓	26 พฤษภาคม 2553

ประวัติการแก้ไข)

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข
01	13 กันยายน 2555	✓ ✓	✓ ✓	จากเดิม 6.4 ท่านอนตะแคง (Side lying position) ท่านี้เหมาะสมสำหรับแม่ที่ผ่าตัดคลอดหลังคลอดใหม่ ๆ แม่ที่อ่อนเพลีย
				แก้ไขเป็น 6.4 ท่านอนตะแคง (Side lying position) ท่านี้เหมาะสมสำหรับแม่ที่ผ่าตัดคลอดใหม่ ๆ ทำหมัน หรือหลังการคลอดใหม่ ๆ แม่ที่อ่อนเพลีย เพื่อแม่จะได้พักผ่อนบ้าง

 <p>เป็นโรงพยาบาลศุลกภาพขั้นนำของ กทม.สังกrüชณ์ได้ภายในปี 2559</p>	<p>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</p> <p>วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION</p>	<p>หมายเลขอสาร WI-NUR01-005</p> <p>หน้า 1/3</p> <p>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 01 วันที่บังคับใช้ : ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕</p>
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำให้นม		

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มารดาสามารถให้นมหากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต

หลักหลังคลอดทุกรายที่ให้นมหาก

3. นิยามศัพท์

การจัดทำให้นมหมายถึงการที่บุคลากรทางการพยาบาลแนะนำการทำท่างต่างๆ ที่มารดาให้นมหาก เพื่อช่วยให้การดูดนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

5.1 หมอนสำหรับรองตัวเด็ก 1-2 ใบ

5.2 หมอนเข็ม

5.3 เก้าอี้มีพนักพิงหรือโซฟา

5.4 เก้าอี้เตียงฯ สำหรับรองเท้า

5.5 เตียงนอน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

6.1 การดูดนมท่าเปล (Cradle position) แม่นั่งเก้าอี้ มีพนักพิง หรือโซฟา โดยมีหมอนรองรับศีรษะและลำตัว ของลูก ถ้าเก้าอี้สูงเกินไป นำเก้าอี้เตียงฯ มาวางรองรับเท้าทั้ง 2 ข้าง ท่านี้เหมาะสมสำหรับแม่หลังคลอดที่มีหัวนมปกติ

6.1.1 อุ้มลูกแนวอกโดยใช้แขนด้านเดียวกับเด้านมข้างที่จะให้ดูด

6.1.2 ให้ศีรษะลูกอยู่ที่ข้อพับแขน

6.1.3 ฝ่ามือแม่ ประคองด้านหลัง

6.1.4 เหยียดแขนลูกด้านล่างไปข้างลำตัวแม่

6.1.5 ปากลูก อยู่ตรงหัวนมพอดี

6.1.6 ใช้หัวนมแม่เกี่ยริมฝีปากล่าง และรอให้ลูกอ้าปากกว้างสุด เคลื่อนบริเวณคงลูกเข้าเต้าจะทำให้ลูกอมหัวนมได้ลึก กระชับ เพื่อการดูดที่ยึดติดแน่น และได้น้ำนม

6.1.7 ศีรษะลูกและลำตัวอยู่ในแนวตรง โดยจัดให้ศีรษะอยู่สูงกว่าลำตัวเล็กน้อย

ใบงานทั่วไป

 เป็นโรงพยาบาลศุภภาพชั้นนำของ กทม.สังกัดรัฐบาลตั้งแต่ปี 2559	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขอเอกสาร WI-NUR01-005 ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 01 วันที่บังคับใช้ : 13 ก.ย. 2555	หน้า 2/3
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดท่าให้นม			

6.2 ท่าเปลปลั๊กต์ (Cross cradle) แม่นั่งเก้าอี้ มีพนักพิงหรือโซฟา โดยมีหมอนรองรับศีรษะและลำตัวของลูก ถ้าเก้าอี้สูงเกินไป นั่งเก้าอี้เตี้ยๆ มาวางรองรับเท้าทั้ง 2 ข้าง ท่านี่เหมาะสมสำหรับแม่ที่หัวนมสั้น แบบ บอด หรือบุ๋มหรือมีภาวะ Pseudo invert Nipple เพราะทำให้ทำการกอมหัวนมได้ลึก กระชับยิ่งขึ้น

- 6.2.1 อุ้มลูกแบบยกโดยใช้แขนด้านตรงข้ามกับเด้านมข้างที่จะให้ลูกดูด
- 6.2.2 ใช้แขนด้านตรงข้ามเด้านมข้างที่จะให้ดูด โดยลำตัวของลูกไว้
- 6.2.3 ฝ่ามือแม่ประคองต้นคอของลูก
- 6.2.4 เหยียดแขนล่างของลูกไปข้างลำตัวแม่
- 6.2.5 ให้ปากลูกอยู่ตรงหัวนมพอดี
- 6.2.6 จัดให้ศีรษะลูกและลำตัวอยู่ในแนวตรง โดยจัดให้ศีรษะอยู่สูงกว่าลำตัวเล็กน้อย

6.3 ท่าฟุตบอล (Football hold position) แม่นั่งเก้าอี้ มีพนักพิงหรือโซฟา โดยมีหมอน 2 ใบ รองรับลำตัวลูก วางข้างลำตัวแม่ 1 ใบ และวางเอียงบนต้นขาแม่ ข้างที่จะให้นมลูกอีก 1 ใบ ถ้าเก้าอี้สูงเกินไป มีเก้าอี้เตี้ยๆ วางเท้าแม่ทั้ง 2 ข้าง ท่านี่เหมาะสมสำหรับแม่ที่ผ่าตัดคลอด หรือหัวนมสั้น แบบ บอด หรือบุ๋ม

- 6.3.1 อุ้มลูกให้นอนตะแคงไว้ข้างลำตัวแม่
- 6.3.2 แม่ใช้แขนด้านเดียวกับเด้านมข้างที่จะให้ลูกดูด
- 6.3.3 โอบลำตัวลูกไว้ข้างลำตัวแม่ให้ขาลูกชี้ไปทางด้านหลังของแม่
- 6.3.4 ฝ่ามือแม่ประคองศีรษะลูกเข้าหาเด้านม
- 6.3.5 ปากลูกอยู่ตรงหัวนมพอดี
- 6.3.6 จัดให้ศีรษะลูกสูงกว่าลำตัวเล็กน้อย
- 6.3.7 จมูกลูกชิดเด้านมแม่ คงลูกแบบชิด ริมฝีปากลูกนานออกแบบ ลูกจะอมหัวนมได้กระชับ

6.4 ท่านอนตะแคง (Side lying position) ท่านี่เหมาะสมสำหรับแม่ที่ผ่าตัดคลอด ทำหมัน หรือหลังการคลอดใหม่ๆ แม่ที่อ่อนเพลีย เพื่อแม่จะได้พักผ่อนบ้าง

- 6.4.1 แม่นอนหนุนหมอน 2 ใบ
- 6.4.2 แม่และลูกนอนตะแคงเข้าหากัน
- 6.4.3 อุ้มลูกโดยใช้แขนด้านเดียวกับเด้านมข้างที่จะให้ดูด
- 6.4.4 ให้ศีรษะของลูกอยู่ที่ข้อพับแขนของแม่
- 6.4.5 แบบแม่โอบลูกไว้มือแม่จับที่ต้นขาของลูก เพื่อสะคอกเวลาที่จะเลื่อนปากลูกให้ตรงกับหัวนมแม่

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำของ กทม.สังกงชานได้ ภายใต้ปี 2559	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขอสาร WI-NUR01-005 ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 01 วันที่บังคับใช้ : 13 ก.ย. 2555
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำให้นม		

7. เอกสารอ้างอิง

- 7.1 นิพรรณพร วรมงคล คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ โรงพยาบาลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2550
- 7.2 สุารีย์ อันตรารา คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. กรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552

8. บันทึก

- ไม่มี

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

